

第23回 日本乳癌学会東北地方会 教育セミナー（治療編）

## 術前化学療法後の標準的薬物治療アップデート


(NAC ; neoadjuvant chemotherapy)

岩手県立江刺病院 外科

松井 雄介

# 症例1 TNBC

- 55歳女性、閉経後
- 腫瘍径35mm、リンパ節転移2個
- cT2N1M0、cStage IIB
- IDC, ER(0), PgR(0), HER2(0), Ki67 50%
- gBRCA1陽性
- ECOG PS0




質問

①NACで推奨されるレジメンは？

# 症例1 TNBC

- 55歳女性、閉経後
- 腫瘍径35mm、リンパ節転移2個
- cT2N1M0、cStage IIB
- IDC, ER(0), PgR(0), HER2(0), Ki67 50%
- *gBRCA1*陽性
- ECOG PS0
- Bt+Axを実施：pCRの結果だった




## 質問

- ②術後の薬物治療は何を行いますか？
- ③non-pCRだった場合はどのような薬物治療を行いますか？

## 症例2 HER2陽性

- 53歳女性、閉経後
- 腫瘍径40mm、リンパ節転移2個
- cT2N1M0、cStage IIB
- IDC, ER(0), PgR(0), HER2(3+), Ki67 40%
- ECOG PS0
- NAC (EC 4コース→Per/Her/DTX 4コース)
- Bt+Axを実施：ypT1aN0M0 ypStage I
- non-pCRの診断



### 質問

- ① 術後の薬物治療は何を行いますか？
- ② pCRだった場合はどのような薬物治療を行いますか？